

# 16 வயதுக்குப்பட்ட சிறார்களுக்குத் தடுப்புசி போடுவதில் உள்ள பாதுகாப்பு அக்கறைகள்

கொவிட்-19 தடுப்புசி வாய்ப்பு வரி கைப் பட்டியலில் 16 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறார்கள் கடைசியில் இருக்கிறார்கள். இருந்தாலும் அவர்களுக்குத் தடுப்புசி போடலாம் என்ற அனுமதி கிடைப்பதற்கு முன்பு பல்வேறு ஆய்வுகளை நடத்தி பலவற்றையும் கண்டறிய வேண்டிய நிலை இருக்கிறது.

கொரோனா கிருமித்தொற்றுக்கு சிறார்கள் ஆளாகிவிடக்கூடிய ஆபத்து அதிகம் என்ற நிலை இல்லாவிட்டாலும்கூட ஒரு சமூகத் திற்கு நோய்த் தடுப்பாற்றல் தேவையெனில் அந்தப் பிரிவினினருக்கும் தடுப்புசி போட வேண்டியது உயிர்நாட்டியான ஒன்று என்று மருத்துவத் தொழிலர்கள் கூறுகிறார்கள்.

சிறார்களுக்கு எந்த தடுப்புசி யைப் போடுவது என்பதும் இன்ன மும் உறுதியாகத் தெரியவில்லை. ஃபைசர்-பயோளன்டெக் கூடுப்புசி 16 வயது குறைந்த பின்னளைகளுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.

18க்கும் குறைந்த வயதுள்ளோருக்கு மொடர்னா தடுப்புசியைப் போட வேண்டுமானால் அதற்கு

முன்னதாக பாதுகாப்பு தொடர்பான பல்வேறு தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. 12 மற்றும் அதற்கும் அதிக வயதுள்ள சிறார்களுக்கு இந்தத் தடுப்புசிகள் பரிசோதனை ஆய்வுப்படையில் சோதித்து பார்க்கப்பட்டு வருகின்றன.

12 முதல் 15 வயர்ப்பட்ட பதின்ம வயதினர் 2,260 பேரிடம் 100% ஆற்றலை ஃபைசர்-பயோளன்டெக் ஊசி வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது. அதேபோல மொடர்னா 12 முதல் 17 வயர் வயதுள்ள 3,000 பதின்ம வயதினரிடம் பரிசோதிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த இரண்டு தடுப்புசி நிறுவனங்களும் 12 வயது குறைந்த சிறார்களிடம் பரிசோதனைகளைத் தொடங்கி இருக்கின்றன.

இதனிடையே, பிறப்பில் இருந்து 11 முதல் 12 வயது வரைப்பட்ட காலத்தில் ஒருவரின் உடலில் தடுப்பாற்றல் மிகவும் வளர்ச்சி அடையாத நிலையிலேயே இருக்கும். அல்லது அது முற்றிலும் செயல்படாத நிலையிலேயே இருக்கும்



என்று சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக் கழகத்தின் யோங் லூ லின் மருத்துவப் பள்ளியைச் சேர்ந்த இணைப் பேராசிரியர் சில்வி அலோன்சோ கூறுகிறார்.

ஆகவே 11 வயது குறைந்த சிறார்களிடம் ஊசி ஏற்படுத்தக் கூடிய விளைவு, பெரியவர்களிடம் அந்த ஊசி ஏற்படுத்தக் கூடிய விளைவுகளில் இருந்து வேறுபட்டு இருக்கும் என்றும் அவர்கள் பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டியது முக்கியமானது என்று அவர்கள் தெரிவித்தார்.

இவ்வேளையில், பெரியவர்கள்

நியூயார்க்கில் ஹனா ரிவர் ஹோஸ்பிட்க் எனும் 16 வயது பெண்ணுக்கு இம்மாதம் ஆம் தேதி ஃபைசர் நிறுவனத்தின் முதலாவது கொவிட்-19 தடுப்புசி போடப்பட்டது.

**படம்:** ராய்ட்டர்

தன் ஓப்பிடுகையில் சிறார்களுக்கு ஒவ்வாமை அதிகம் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு என்று ஆசிய பசிபிக் மருந்துகள் நுண்ணுயிரியல் சங்கத் தலைவர் பேராசிரியர் பால் தம்பையா கூறினார்.

ஆகையால் சிறார்களுக்குத் தடுப்புசி போடுவதற்கு முன்பு அதனால் ஏற்படக்கூடிய கடுமையான ஒவ்வாமை ஆபத்துகள் பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டியது முக்கியமானது என்று அவர்கள் தெரிவித்தார்.